

*DESCRIPTION DE CYPRINIDÉS NOUVEAUX DE SE-TCHUAN,*

PAR M. TCHUNG-LIN TCHANG.

**Leptobarbus Pingi**, nov. sp.

Hauteur du corps comprise 3 fois dans la longueur sans la caudale. Tête contenue 3 fois  $1/2$  dans la même dimension. Œil contenu 7 fois  $3/4$  dans la longueur de la tête, 2 fois  $2/5$  dans l'espace interorbitaire, 2 fois  $1/3$  dans la longueur du museau. Museau contenu 3 fois  $2/5$  dans la longueur de la tête. Narines près de l'œil. Bouche terminale. Barbillons 4, le postérieur contenu 3 fois  $1/2$  dans la longueur de la tête, un peu plus long que l'intérieur. Orifice cloacal près de l'anale. Ligne latérale plus rapprochée du ventre que du dos, et un peu inférieure sur le pédicule caudal. Vessie natatoire glande, deux parties. Dents pharyngiennes sur 3 rangées; 2, 3,  $5/5$ , 3, 2. Dorsale débutant plus près de la racine de la caudale que du bout du museau, sans rayon ossifié. Pectorale courte, n'atteignant pas la ventrale. Ventrale opposée la dorsale, n'atteignant pas l'anale, une forte écaille pointue à la base. Caudale fourchue.

Couleur du dos grise, la tête et les écailles avec taches noires.

D.  $3/8$ ; A.  $3/5$ ; P.  $1/7$ ; V.  $1/8$ ; Sq. 9  $1/2/53/11$ .

Longueur totale : 440 millimètres. Se-tchuan : M. Wen-peï Fang.

**Xenocypris katinensis**, nov. sp.

Hauteur du corps comprise 3 fois  $4/5$  dans la longueur sans la caudale. Tête contenue 5 fois dans la même dimension. Abdomen arrondi. Œil contenu 1 fois  $2/5$  dans l'espace interorbitaire, 3 fois  $1/2$  dans la longueur de la tête, aussi long que la longueur du museau. Bouche inférieure, transversale, Pas de barbillons. Dents pharyngiennes comprimées, sur 3 rangées; 2, 4, 6,  $/6$ , 3, 2, les deux rangées intérieures très petites. Vessie natatoire en 2 parties. Écailles moyennes, 9 à 10 entre la ligne latérale et la dorsale, 6 entre la ligne latérale et la ventrale. Dorsale débutant un peu plus près du bout du museau que de la racine de la caudale, en avant de l'origine de la ventrale, son troisième rayon simple, fortement ossifié. Pectorale plus courte que la tête, n'atteignant pas la ventrale, Ventrale plus courte que la pectorale, n'arrivant pas l'anale, une forte écaille à la base. Caudale fourchue.

*Bulletin du Muséum*, 2<sup>e</sup> s., t. II, n<sup>o</sup> 1, 1930.

Couleur argentée, le dos grisâtre.  
D. 3/7; A. 3/11; P. 1/15; V. 1/8; L. lat. 60.  
Longueur totale : 240 millimètres.  
Katin : M. Wen-pei Fang.

ONYCHOSTOMA LATICEPS Günther var. **fontouensis** nov. var.

Hauteur du corps comprise 3 fois  $1/2$  dans la longueur sans la caudale. Tête contenue 4 fois  $3/4$  dans la même dimension. Œil contenu 5 fois dans la longueur de la tête, 2 fois  $1/4$  dans la longueur du museau, 2 fois  $3/4$  dans l'espace interorbitaire. Bouche inférieure et transversale. Mâchoire inférieure munie d'une arête transversale, recouverte d'un étui corné et tranchant. Pas de barbillons. Dents pharyngiennes un peu comprimées, sur 3 rangées : 2, 3,  $4/4$ , 3, 2. Orifice cloacal près de l'anale. Ligne latérale presque en ligne droite. Ecailles moyennes,  $4\ 1/2$  entre la ligne latérale et la ventrale. Dorsale débutant plus près du bout du museau que de la racine de la caudale, son troisième rayon simple, ossifié et denticulé. Pectorale courte, n'atteignant pas la ventrale. Ventrale n'arrivant pas l'anale, opposée la dorsale. Caudale fourchue.

Couleur jaunâtre, le dos gris.  
D. 3/8; A. 2/5; P. 1/16; V. 1/8; Sq.  $7\ 1/2/48/7\ 1/2$ .  
Longueur totale : 240 millimètres.

Fontou : M. Che-tau Kiang.

Cette variété est voisine de *Onychostoma laticeps*, Günther, dont elle se distingue par l'origine de la dorsale située en arrière de la partie plus haute du corps et par son pédicule caudal plus long.

En terminant cette note, je me fais un devoir de remercier M. le professeur Louis Roule et M. le docteur Jacques Pellegrin pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés.